

Loica común:

Habita las estepas arbustivas y los pastizales fueguinos. Mide 22 cm. El macho es de color marrón aperdizado en su dorso, con la ceja de color blanca y la garganta y pecho rojos. La parte inferior del ala es blanca. La hembra presenta un color más pardo, la garganta clara y el resto un rojo más pálido. Es residente.*



Bibliografía

- *Explorando Tierra del Fuego*. Ma. Laura Borla y Marisol Vereda. Buenos Aires, Zagier & Urruty Publications (2001).
- *Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Guía de campo*. Clark, R. Edición U.O.L.A. (1986).
- *Guía de aves de Patagonia & Tierra del Fuego*. Narosky, T., Babarskas, M.e Izurieta, D. Ushuaia, Zagier & Urruty Publications(2000).

 muniush@gmail.com

 Turismo Ushuaia

Información libre y gratuita. Solicite este folleto en formato digital:

muniush@gmail.com / www.turismoushuaia.com



SECRETARIA DE
TURISMO

AVIFAUNA DE TIERRA DEL FUEGO

2-

Aves de claros

Bandurria austral:

Habita las estepas arbustivas fueguinas. Nidifica en acantilados de montaña o costeros, en los pastizales y el bosque. Mide 57 cm. A menudo vive en pareja. Tiene un largo pico curvo. Su cabeza y cuello son acanelados. Su dorso es de color gris, con una mancha blanca en el ala plegada, mientras que lo inferior de las alas y el vientre son negros. Sus patas son rojizas. Llega a fines del invierno, en otoño se desplaza al norte. Es migratoria.*



Dormilona cara negra:

Es común verla en la zona sur de la región, hasta el Cabo de Hornos. Mide 15 cm. Posee una coloración modesta, con una cara negruzca que pasa a marrón en la corona. La espalda, alas y cola son oscuras; la garganta, pecho y vientre son grises claros. En otoño se desplaza en bandadas hacia el norte. Es migratoria.*



Diucón:

Habita los bordes del bosque, claros, turbales y zonas arbustivas. Mide 19 cm. Vive solitario o en pareja. Posee el dorso de color gris oscuro y el lomo tiene un tono más pálido. La parte ventral es grisácea, con garganta y vientre blancuzcos. Sus ojos son rojos. Es residente.*





Sobrepuesto:

Habita bordes de lagunas, campos, mallines y costas del mar en Tierra del Fuego. Mide 11 cm. Su cabeza, garganta, pecho, vientre, alas y cola son totalmente negros; la espalda es castaña rojiza (este contraste ha originado el nombre de sobrepuesto). La hembra se caracteriza por su cabeza gris oscura, alas y cola oscuras, garganta, pecho y vientre blancuzcos y espalda canela. En otoño se desplaza al norte. Es migratorio.*

Tero común:

Habita en mallines y prados, cerca del agua, en la Isla Grande, la Isla de los Estados e islas del Canal Beagle. Suele andar en parejas o en grupos. Es muy conocido por su característico grito de alarma que da origen a su nombre común. El área dorsal de su cuerpo es de color gris, con reflejos verdes y violetas en los hombros, pecho negro y vientre blanco, copete negro, pico, patas y espolón del ala rojizos. Al volar se ven las alas, por debajo, negras y blancas. Sus ojos son negros. Es migratorio.*



Cauquén común:

Habita en campos abiertos como las estepas herbáceas. Es más abundante en la zona norte de Tierra del Fuego que en los boques del sur. Se lo ve a menudo en grupos, cerca del agua. Mide 54 cm., es el más grande de los cauquenes. El macho es de color blanco, con dorso barrado de negro, tiene pico y patas negros. La hembra es de color marrón, con dorso y vientre barrados de negro y patas anaranjadas. En otoño se desplaza al norte. Es migratorio.*

Cauquén real:

Habita en terrenos abiertos con pastizales y áreas inundadas en las cercanías de zonas arbustivas y forestadas. También en la costa y aguas interiores como ríos, estuarios y lagunas. Es abundante en la zona sur y oeste de la región. Mide 53 cm. Vive en parejas o grupos. Tiene cabeza y cuellos grises, dorso y pecho rojizos barrados de oscuro y vientre blanco. En otoño se desplaza al norte. Es migratorio



Aves de estepa

Agachona chica:

Habita las estepas herbáceas y arbustivas en Tierra del Fuego. Mide 18 cm. El macho posee la garganta blanca rodeada por una línea negra, continuada como corbata por el centro del pecho de color gris. El resto de la parte ventral es blanca. La hembra tiene el pecho aperdizado. En otoño se desplaza al norte. Es migratoria.*



Caminera común:

Habita estepas herbáceas y arenales de tierra. Mide 14 cm. Tiene pico largo y fino y alas de color rojizo. Presenta la cola negruzca, con una ancha base y bordes color ocre. La parte ventral es blancuzca con notable escamado oscuro en el pecho. En otoño se desplaza al norte. Es migratoria



Espartillero común:

Habita en matorrales al pie de los Andes, cerca del bosque fueguino. Mide 15 cm. Posee el dorso de color ocre manchado de negro. Lo ventral es también ocre, con el pecho y los flancos punteados de oscuro. Su cola larga y ancha termina en puntas.

